


## Krankheitskontrolle



Schorf	<b>Cuprofix Fluid</b> (0,15%) 2,4 l/ha oder <b>Delan WG</b> (0,05%) 0,8 kg/ha	Bei hellchaligen Sorten (Golden Delicious, Pinova, Glockenapfel, Greenstar, Granny Smith, Gravensteiner) wegen Berostungsgefahr nur früh einsetzen.
Schorf, Monilia, Kelchfäule, Echter Mehltau	<b>Chorus</b> (0,05%) 0,8 kg/ha + <b>Thiovit Jet</b> (0,2%) 3,2 kg/ha + <b>Delan WG</b> (0,03%) 0,48 kg/ha oder + <b>Malvin WG/Captan 80 WDG</b> (0,1%) 1,6 kg/ha	Chorus: Max. 3 Behandlungen ab Austrieb bis Ende Blüte. Delan WG: Bis spätestens Ende Juni anwenden. Malvin WG/Captan 80 WDG: Die Sorte Braeburn erst ab Mitte Juni behandeln. Während der Blüte anstelle von Delan WG, Malvin WG/Captan 80 WDG einsetzen. Thiovit Jet nur vor oder nach der Blüte einsetzen.
Schorf, Echter Mehltau, Monilia	<b>Slick</b> (0,015%) 0,24 l/ha + <b>Delan WG</b> (0,03%) 0,48 kg/ha + <b>Topas Vino</b> (0,012%) 0,2 l/ha } oder { <b>Slick</b> (0,015%) 0,24 l/ha + <b>Malvin WG/Captan 80 WDG</b> (0,1%) 1,6 kg/ha + <b>Topas Vino</b> (0,012%) 0,2 l/ha	SSH-Produkte (Slick/Topas Vino): Max. 4 Behandlungen pro Jahr. Topas Vino bei mehltauanfälligen Sorten begeben. Delan: Pro Parzelle und Jahr insgesamt nicht mehr als 3400 g des Wirkstoffs Dithinanon pro Hektare anwenden.
Schorf, Echter Mehltau	<b>Delan Pro</b> (0,14%) 2,25 l/ha + <b>Slick</b> (0,15%) 0,24 l/ha oder <b>Topas Vino</b> (0,012%) 0,2 l/ha	<b>Delan Pro</b> : Nach der Blüte, pro Parzelle und Jahr insgesamt nicht mehr als 3400 g des Wirkstoffs Dithinanon pro Hektare anwenden. Nicht mit Blattdüngern und Pirimor mischen.
Schorf, Echter Mehltau, Lagerkrankheiten	<b>Tega</b> (0,01%) 0,16 kg/ha + <b>Malvin WG/Captan 80 WDG</b> (0,1%) 1,6 kg/ha	Tega: Max. 4 Behandlungen pro Jahr. Keine Spätanwendung (nach Ende Juli) auf Sorte Maigold. <b>Quartet Lux</b> : 0,2% (3,2 l/ha) gegen Schorf (Teilwirkung) und Lagerschorf. Max. 6 Behandlungen pro Parzelle und Jahr, Sortenverträglichkeit beachten.
Lagerkrankheiten	<b>Folpet</b> (0,125%) 2 kg/ha + <b>Etalfix Pro</b> 0,2 l/ha oder <b>Tega</b> (0,015%) 0,24 kg/ha	Gegen Lagerkrankheiten Tega 3 Wochen vor der Ernte einsetzen. Folpet 80 WDG: Behandlungen im Abstand von 2 Wochen. Wartefrist: 3 Wochen.
Lagerkrankheiten	<b>Sapphire</b> (0,025%) 0,4 kg/ha <b>NEU</b>	Maximal 2 Behandlungen. Wartefrist: 8 Tage
Feuerbrand (Teilwirkung)	<b>Bion 20 g/ha</b> <b>Bion 40 g/ha</b> <b>Bion 20 g/ha</b>	Bion kann jeweils in Tankmischung mit den üblichen Pflanzenschutzbehandlungen ausgebracht werden. Einsatz bis zum Triebabschluss.

## Schädlingskontrolle



Blütenstecher, Blattläuse	<b>Oryx Pro</b> (0,02%) 0,32 kg/ha	Dosierung Blattläuse: 0,015% (0,24 kg/ha), bis Ende Juni
Schalenwickler	<b>Affirm</b> (0,2%) 3,2 kg/ha	
Blattläuse, Sägewespen	<b>Oryx Pro</b> (0,015%) 0,24 kg/ha	Unbedingt Weisungen zum Schutz der Bienen beachten, siehe Packungsaufschrift.
Blattläuse	<b>Pirimor</b> (0,04%) 0,64 kg/ha <b>Pirimor</b> (0,04%) 0,64 kg/ha oder <b>Oryx Pro</b> (0,015%) 0,24 kg/ha <b>Pirimor</b> (0,02%) 0,32 kg/ha	Sommerbehandlung gegen die Grüne Apfelblattlaus <b>Pirimor</b> mit 0,02% anwenden. Max. 2 Behandlungen Dosierung <b>Oryx Pro</b> ab Juli: 0,01% (0,16 kg/ha)
Blutlaus	<b>Pirimor</b> (0,04%) 0,64 kg/ha + <b>Etalfix Pro</b> 0,2 l/ha	2 Spritzungen innert 2 Wochen durchführen. <b>Etalfix Pro</b> 0,2 l/ha zugeben. Warmes Wetter begünstigt die Wirkung. Hohe Brühmenge.
Apfelwickler (auch resistente Typen), Schalenwickler, Kleiner Fruchtwickler	<b>Affirm</b> (0,2%) 3,2 kg/ha <b>Affirm</b> (0,2%) 3,2 kg/ha	Apfelwickler: Erste Behandlung bei Beginn des Larvenschlupfes. Nach 2-3 Wochen wiederholen.
Spinnmilben, Rostmilben	<b>Zenar</b> (0,02%) 0,32 kg/ha	Max. 1 Behandlung pro Saison. <b>Zenar</b> besitzt eine Teilwirkung gegen Rostmilben.