


## Unkrautkontrolle



### Hauptbehandlung

Ideallösung mit Dauerwirkung gegen Unkräuter und Hirsen. Bis 6-Blatt-Stadium. Warmes, wüchsiges Wetter fördert die Wirkung.

**Elumis 1,3 l/ha + Gardo Gold 3-4 l/ha**

Nur einmal Mais innerhalb von 3 Jahren auf derselben Parzelle und kein Dual Gold in Zuckerrüben, Sonnenblumen oder Soja einsetzen.

### Spezielle Behandlungen

In Fräs-, Direkt- und Mulchsaaten

**Touchdown System4 3-5 l/ha**

**Elumis 1,3 l/ha + Gardo Gold 3-4 l/ha**

Touchdown System4 (Totalherbizid): Vor der Saat auf 10 cm hohes Unkraut.

In Karstgebieten (ohne S2 und Sh)

**Elumis 1,3 l/ha**

Anstelle von Elumis kann auch Callisto 1,0 l/ha und Stomp Aqua 3 l/ha eingesetzt werden.

Bei pfluglosem Rüben- und Erbsennachbau

**Gardo Gold 4 l/ha + Nicogan 1 l/ha + Banvel 4S 0,5 l/ha**

## Übersicht Mais Herbizide

<b>Elumis 1,3 l/ha</b>	Nicht mehr als 60 g des Wirkstoffs Nicosulfuron pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von 2 Jahren anwenden. Nicht in Grundwasserschutz zonen S2 und Sh anwenden.
<b>Gardo Gold 3-4 l/ha</b>	Nicht mehr als 1,5 kg des Wirkstoffes S-Metolachlor pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von drei Jahren. Nicht mehr als 1 Behandlung alle drei Jahre auf derselben Parzelle mit einem Terbutylazin-haltigen Produkt. Nicht in Karstgebieten und Grundwasserschutz zonen S2 anwenden.
<b>Dual Gold 1-1,6 l/ha</b>	Nicht mehr als 1,5 kg des Wirkstoffes S-Metolachlor pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von drei Jahren. Nicht in Karstgebieten und Grundwasserschutz zonen S2 anwenden.
<b>Nicogan 1-1,5 l/ha</b>	Nicht mehr als 60 g des Wirkstoffs Nicosulfuron pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von 2 Jahren anwenden. Nicht in Grundwasserschutz zonen S2 und Sh anwenden.
<b>Calaris 1,5 l/ha</b>	Nicht mehr als 1 Behandlung alle drei Jahre auf derselben Parzelle mit einem Terbutylazin-haltigen Produkt. Nicht in Karstgebieten und Grundwasserschutz zonen S2 anwenden.
<b>Callisto 0,5-1,5 l/ha</b>	Keine Restriktionen.
<b>Banvel 4S 0,5 l/ha</b>	Keine Restriktionen.
<b>Stomp Aqua 2,6-3,5 l/ha</b>	Keine Restriktionen.

Beratung anfordern

### Gardo Gold

Bodenherbizid. Gute Wirkung gegen einjährige Unkräuter und Ungräser. Als Basisherbizid in Mischung mit Elumis, Nicogan, Banvel 4S oder Callisto. Nicht nach dem 30. Juni anwenden.

### Calaris

Breit wirksames Herbizid mit Boden- und Kontaktwirkung. Als Basisprodukt für verschiedene Kombinationen. Mischungen mit Dual Gold im frühen Einsatz gegen Hirsen. Nachbau: Wenn Zuckerrüben oder Erbsen als Nachfolgekultur folgen, ist eine Pflugfurche notwendig. Nicht nach dem 30. Juni anwenden.

### Callisto

Herbizid mit Boden- und Kontaktwirkung. Kombinationen mit anderen Herbiziden möglich. Nachbau: Wenn Zuckerrüben oder Erbsen als Nachfolgekultur folgen, ist eine Pflugfurche notwendig.

### Nicogan

Gute Wirkung auf Gräser und grössere Hirsen. Als Mischpartner zu Calaris, Callisto oder Gardo Gold. Aktives Wachstum und wüchsiges Wetter verbessern die Wirkung. Quecken bei 10-20 cm Wuchshöhe behandeln. Saat- und Zuckermals nicht mit Nicogan behandeln.

### Elumis

Herbizid mit sehr breiter Wirkung inklusive aller Hirsen sowie Boden- und Kontaktwirkung. In der Mischung mit Gardo Gold wird die Langzeitwirkung noch deutlich verbessert. Dank der OD-Formulierung werden die Wirkstoffe schneller aufgenommen. Dadurch ist auch die Regenbeständigkeit besser. Die sauberste und nachhaltigste Lösung. Beim Nachbau von Rüben, Erbsen, Bohnen oder Gemüse und mit nur oberflächlicher Bodenbearbeitung können vorübergehend Blattaufhellungen auftreten. In solchen Fällen auf den Nachbau dieser Kulturen verzichten.

### Dual Gold

Bodenherbizid für frühe Behandlungen mit ausgeprägter Dauerwirkung, speziell auf alle Hirsearten. Guter Mischpartner mit Calaris für eine breite Wirkung gegen einjährige Unkräuter inkl. Hirsen. Erdmandelgras: Dual Gold (2 l/ha) als Vorsaatbehandlung mit anschließender Einarbeitung.

### Banvel 4S

Gegen Blacken, Disteln und Winden einsetzbar (0,5 l/ha), sobald diese genügend Blattmasse aufweisen. (Rückenspritze: 20 ml/10 Liter.) Warmes wüchsiges Wetter erforderlich. Phytotox-Risiko ab 6-Blatt-Stadium.



Mais Saatgut von Syngenta ist für alle Anbauregionen nördlich der Alpen verfügbar. Genauere Informationen finden Sie auf der Seite 6.

## Mischtabelle

	Banvel 4S	Calaris	Callisto	Nicogan	Dual Gold	Elumis	Gardo Gold	Genol Plant	Stomp Aqua
● mischbar									
Banvel 4S		●	●	●	●	●	●		
Calaris	●			●	●				●
Callisto	●			●	●		●		●
Nicogan	●	●	●		●		●	●	●
Dual Gold	●	●	●	●		●			●
Elumis	●				●		●		
Gardo Gold	●		●	●		●			
Genol Plant				●					
Stomp Aqua		●	●	●	●				



**HINWEIS**  
Abstandsauflagen siehe Seite 94

## Herbizide für Mais

	Amarant	Franzosenkraut	Gänsefuss (Meide)	Kleibern (Klettenlabkraut)	Knöterich-Arten	Nachtschatten	Ruten-/Gem. Meide	Winden/Disteln/Blacken	Borstenhirse	Blut-/Fingerhirse	Hühnerhirse	Raygras/Quecken	Dosierung in l/ha
● Vollwirkung ○ Teilwirkung													
Banvel 4S	●	●	●	●	●	○	○	●					0,3-0,6
Calaris	●	●	●	●	●	●	●			○	●		1,5
Callisto	●	●	●	○	●	●	●	○		○	●		1,0-1,5
Nicogan	●		○		○		○		●	○	●	●	1,0-1,5
Dual Gold	○	○	○	○	○	○	○		○	●	●		1,25
Elumis	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	1,3
Gardo Gold	○	●	○	●	●	○	○		○	●	●		4,0
Stomp Aqua	●	○	●	●	●	●	○		●	●	●		2,6-3,5
Calaris + Nicogan	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	1,5 1,0
Calaris + Dual Gold	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●		1,5 1,25
Elumis + Banvel 4S	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	1,3 0,5
Elumis + Gardo Gold	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	1,3 4,0
Gardo Gold + Nicogan + Banvel 4S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,0 1,0 0,5

### Limax Power

Zur Vermeidung von Schneckenfrass an auflaufenden Saaten im Feld- und Gemüsebau, speziell nach einem nassen Frühjahr. Mais: Ab Aussaat bis zum 2-3-Blatt-Stadium der Kultur, 5 kg/ha.

### Wuxal P Plus

2-5 l/ha, fördert Jugendentwicklung. Einmaliger Einsatz bei witterungsbedingten Wachstumsdepressionen.