


Zucker-/Futterrüben

Zucker-/Futterrüben



Unkrautkontrolle

Grundbehandlungen

Direkt- oder Mulchsaaten	Touchdown System4 3–5 l/ha		Vor der Saat.
1. Splitbehandlung		Sugaro Pro 1 l/ha + Sugaro Gold/Gamma 1–1,5 l/ha	Bei starkem Unkrautdruck insbesondere von Hundspetersilie, Ausfallraps, Klebern, kann der angegebenen Mischung noch Debut oder Dual Gold beigemischt werden.
2. Splitbehandlung		Sugaro Pro 1,5 l/ha + Sugaro Gold/Gamma 1,5 l/ha + Dual Gold 0,3 l/ha	5–7 Tage später bzw. sobald neue Unkräuter auflaufen. Statt Sugaro Gamma kann auch Pyramin DF eingesetzt werden (gegen Windenknöterich).
Zwischenbehandlung (Stoppspritzung) bei Hundspetersilie, Ausfallraps, Klebern, u.a.		Sugaro Pro 1,5 l/ha + Debut 30 g/ha + Dual Gold 0,2 l/ha	Wüchsiges Wetter erforderlich.
3. Splitbehandlung (+ evtl. 4. Splitbehandlung)		Sugaro Pro 2 l/ha + Pyramin DF 2 kg/ha oder Sugaro Gold/Gamma 2 l/ha + Dual Gold 0,2–0,35 l/ha	Statt Pyramin DF kann Sugaro Gamma verwendet werden. Dual Gold: Total bewilligte Menge 1,05 l/ha pro Jahr.

Ergänzungsbehandlungen

Gräser inkl. Quecken	Fusilade Max 1,5–3 l/ha	Gegen Quecken 3 l/ha verwenden. Wartefrist: 8 Wochen.
Disteln, Ausfallsonnenblumen	Lontrel 100 1,2 l/ha + Genol Plant 2 l/ha	Disteln/Sonnenblumen: 20–40 cm hoch.
Hundspetersilie, Klebern, Ausfallraps, Kamille, Winden	Debut 30 g/ha + Etafix Pro 0,2 l/ha	Wüchsiges Wetter erforderlich. Auf kleine Unkrautstadien (2-Blatt).

Krankheitskontrolle

Rhizoctonia (Wurzelfäule)	Amistar Xtra 0,8 l/ha	
Blattkrankheiten (Cercospora, Ramularia, Echter Mehltau, Rost)	Spyrale 1 l/ha	Zusätzlich kann in einer Spritzfolge auch Priori Top (1 l/ha) eingesetzt werden.
Blattkrankheiten (Cercospora, Ramularia, Echter Mehltau, Rost)	Opus Top 1,2 l/ha oder Avenir Pro 0,5 l/ha	Zusätzlich kann in einer Spritzfolge auch Priori Top (1 l/ha) eingesetzt werden.

Schädlingskontrolle

ÖLN Vorschriften beachten

Erdflöhe, Erdraupen, Blattläuse, Rübenfliege	Karate Zeon 0,075 l/ha	Nur mit Sonderbewilligung.
Blattläuse	Pirimor 0,25 kg/ha	Wenn Bekämpfungsschwellen erreicht sind.

Blattdünger

Gezielte Blattdünger	Wuxal P Plus 2–5 l/ha	Wuxal Bor Plus 1,75–2,25 l/ha	Wuxal Suspension Mn 4 l/ha	bzw.	Wuxal Susp. Mg 3–5 l/ha	Mischbar mit Fungiziden.
----------------------	---------------------------------	---	--------------------------------------	------	-----------------------------------	--------------------------

Dual Gold

Dual Gold bei sandigen oder sauren Böden erst ab 2. Split zu setzen. Dual Gold beim 1. Split nur bei Hundspetersilie beifügen. Total bewilligte Menge 1,05 l/ha pro Jahr. Zum Schutz von Grundwasser nicht mehr als 1,5 kg des Wirkstoffs S-Metolachlor pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von 3 Jahren anwenden.

Fusilade Max

Gegen Quecken höhere Dosierung verwenden (beste Wirkung bei 15–20 cm Wuchshöhe). In Mischungen mit Sugaro-Produkten maximal 1 l/ha.

Lontrel 100

Gegen Ausfallsonnenblumen (frühe Stadien) und auf 20–40 cm hohe Disteln bei wüchsigem Wetter (mind. 16°) behandeln. Mischbar mit Sugaro-Produkten.

Pyramin DF

Bodenherbizid in Kombination mit Sugaro-Produkten. Gute Blattwirkung auf aufgelaufenem Windenknöterich. Bei humosen Böden höhere Dosierung verwenden.

Sugaro Gold/Gamma

Bodenherbizid mit dem Wirkstoff Metamitron. Unterstützt die Wirkung ab dem 1. Split gegen aufgelaufenes und neu auflaufendes Unkraut, besonders bei Kamille und Raps. Bei humosen Böden höhere Dosierung verwenden. Max. 5 l/ha.

Sugaro Pro

Blattherbizid für aufgelaufenes Unkraut; in Kombination mit Bodenherbiziden einsetzen. Splitbehandlungen im Abstand von max. 7 Tagen bringen den nachhaltigsten Erfolg. Max. 7 l/ha.

Limax Power

Schneckenkörner mit hoher Regengfestigkeit. Max. 700 g Metaldehyd pro ha und Jahr. Abstand zwischen 2 Behandlungen 14 Tage.

Spyrale

Spyrale ist ein systemisches Fungizid mit den beiden Wirkstoffen Difenconazol und Fenpropidin, die sich hinsichtlich des Wirkungsspektrums hervorragend ergänzen und verstärken. Beide Wirkstoffe werden rasch von der Blattoberfläche aufgenommen und im gesamten Blatt gleichmäßig verteilt. Spyrale wirkt hauptsächlich vorbeugend. Max. 2 Behandlungen. Wartefrist: 4 Wochen.

Amistar Xtra

Kombiniertes Fungizid zur vorbeugenden Behandlung gegen Rhizoctonia. Gegen Blattkrankheiten (Ramularia, Cercospora, Echter Mehltau und Rost) ab Befallsbeginn für die erste Behandlung. Wartefrist: 5 Wochen.

Avenir Pro/Priori Top

Dringt ins Blatt ein und wirkt vorbeugend und abstoppend. Eine bis zwei Behandlungen ab Befallsbeginn. In Regionen mit hohem Befallsdruck die Behandlung nach spätestens 3–4 Wochen wiederholen. Bei hohen Temperaturen und tiefer Luftfeuchtigkeit (geschlossene Spaltöffnungen) morgens oder abends behandeln (bessere Aufnahme). Wartefrist: 3 Wochen.

Opus Top

Bewährtes Fungizid mit zwei sich ergänzenden Wirkstoffen mit unterschiedlichen Wirkungsweisen. Sie werden rasch von den Pflanzen aufgenommen und in den Blättern gleichmäßig verteilt. Einsatz ab Befallsbeginn. Ideal in einer Spritzfolge mit anderen Syngenta Fungiziden. Max. 2 Behandlungen.

Wuxal Bor Plus

Borreiche Suspension zur Blattdüngung mit effizienter Aufnahme der Nährstoffe ins Blatt. Anwendung im 4-6-Blattstadium oder kurz vor Reihenschluss. Es werden 2 Behandlungen empfohlen.