


Abricots/Pêches/Nectarines

Contrôle des maladies



Maladie	Produit	Dose	Remarque
Cloque, maladie criblée	Cuprofix Fluid (0,4%)	6,4 l/ha	
Cloque	Slick (0,03%)	0,48 l/ha	
Moniliose des fleurs	Chorus (0,05%)	0,8 kg/ha	Chorus : 3 traitements au maximum à partir du débourrement jusqu'à fin floraison.
Maladie criblée, oïdium, moniliose, cloque	Slick (0,02%) + Malvin WG/Captan 80 WDG	0,32 l/ha + 1,6 kg/ha	Produits ISS (Slick) : 4 traitements au maximum par an.
Moniliose des fleurs et des fruits, oïdium, maladie criblée	Tega (0,025%)	0,4 kg/ha	Au maximum 3 traitements par année.
Moniliose des fruits	Switch (0,06%)	1,0 kg/ha	Délai d'attente : 3 semaines. Après la grêle, max. 2 traitements par année.

Contrôle des ravageurs



Ravageur	Produit	Dose	Remarque
Carpocapse (divers)	Affirm (0,2%)	3,2 kg/ha	Sur des jeunes larves.
Pucerons	Pirimor (0,04%)	0,64 kg/ha	
Drosophila suzukii	Oryx Pro (0,02%)	0,32 kg/ha	Application selon l'autorisation OFG (directives 2019). Traitement au stade BBCH 83-87. Délai d'attente : 14 jours.




REMARQUE

Distances de sécurité voir page 94

Petits fruits



Fraisiers



Maladie/Ravageur	Produit	Dose	Remarque
Graminées annuelles, repousses de céréales, chiendents	Fusilade Max	1-2 l/ha	Contre les vivaces, utiliser la dose supérieure.
Oïdium	Slick	0,5 l/ha; 50 ml/100 l	Délai d'attente : 21 jours. Répéter 2 semaines plus tard.
Oïdium	Topas Vino	0,25 l/ha; 25 ml/100 l	Délai d'attente : 21 jours.
Oïdium	Nimrod	1 l/ha; 100 ml/100 l	Délai d'attente : 7 jours. Traiter préventivement.
Oïdium (effet partiel)	Auralis (NOUVEAU)	2 l/ha; 200 ml/100 l	En serre.
Oïdium, taches pourpres, effet partiel contre botrytis	Tega	500 g/ha; 50 g/100 l	Délai d'attente : 2 semaines. Max. 3 traitements.
Oïdium avec effet partiel contre botrytis	Amistar	1 l/ha; 100 ml/100 l	Délai d'attente : 14 jours. Max. 3 traitements.
Botrytis (pourriture grise)	Switch	1 kg/ha; 100 g/100 l	Délai d'attente : 14 jours. Au début et à la fin de la floraison.
Botrytis (pourriture grise)	Saphire	0,5 kg/ha; 50 g/100 l	Délai d'attente : 3 jours. Au max. 2 applications par culture et par année. Si seulement deux traitements sont faits contre le botrytis en totale, au max. un traitement avec Saphire.
Anthonyme, thrips	Karate Zeon	0,2 l/ha; 20 ml/100 l	Délai d'attente : 21 jours. Selon les indications des stations officielles.
Araignées	Zenar	0,4 kg/ha; 40 g/100 l	Avant floraison ou après récolte.
Araignées, tarsonème	Vertimec Gold	0,5 l/ha; 50 ml/100 l	Délai d'attente : 21 jours. 1 traitement par an.
Pucerons	Pirimor	0,4 kg/ha; 40 g/100 l	Délai d'attente : 21 jours.
Pucerons	Sepal	1,5 l/ha; 150 ml/100 l	Délai d'attente : 21 jours.