

Betteraves

Désherbage

Dès la levée des mauvaises herbes, indépendamment du stade de la culture. Sugaro Duo: max. 6 l/ha par année Sugaro Gold: max. 5 l/ha par année	Sugaro Duo 1 l/ha + Sugaro Gold 1-1,5 l/ha
2 ^{ème} application fractionnée: 5-7 jours après ou dès que de nouvelles mauvaises herbes apparaissent.	Sugaro Duo 1,5 l/ha + Sugaro Gold 1-1,5 l/ha + Spectrum 0,3 l/ha
Si nécessaire ajouter le Debut au traitement. Surtout contre l'éthuse faux persil, repousse de colza ou gaillets. Debut: N3, D6	Sugaro Duo 1,5 l/ha + Sugaro Gold 1-1,5 l/ha + Debut 30 g/ha
	Sugaro Duo 2 l/ha + Sugaro Gold 1-1,5 l/ha + Spectrum 0,5 l/ha
Traitements spécifiques. Ethuse faux persil, gaillet, repousse de colza, camomille, liseron (effet partiel). Appliquer sur les jeunes stades des adventices. N3, D6	Debut 30 g/ha + Etalfix Pro 0,2 l/ha
Chardons, repousses de tournesols, ethuse, camomille, bident tripartite. Lontrel peut être mélangé à 0,6 l/ha aux traitements fractionnés des produits de base. N1	Lontrel 100 1,2 l/ha + Genol Plant 2 l/ha
Graminées, chiendents, millets inclus. Contre les chiendents, utiliser 3 l/ha. 8S	Fusilade Max 1,5-3 l/ha
Engrais foliaire liquide	Wuxal P 2-5 l/ha ou Wuxal Bor Plus 1,75-2,25 l/ha
	BBCH 13 21 25 29 30

Profil du produit



Produit de base pour les traitements herbicides. Efficacité principalement foliaire.

Points forts

Herbicide contre graminées et dicotylédones annuelles dans la betterave sucrière

- Application indépendante du stade de la culture
- Large spectre d'activité
- Miscible avec d'autres herbicides

Matières actives

10,1% éthofumesate (100 g/l)
8,8% phénmedipham (80 g/l)

Formulation	Emulsion concentrée (EC)
Cultures	Betteraves à sucre, betteraves fourragère
Période de traitement	en postlevée des betteraves
Spectre d'activité	dicotylédones et graminées annuelles
Dosage	1-2 l/ha par traitement (6 l/ha quantité totale)
Mode d'action	éthofumesate: HRAC-groupe N phénmedipham: HRAC-groupe C1